有効成分；塩酸エペリゾン

剤形；錠剤

含量；50 mg

溶出試験法；本品1個をとり，試験液に水900 mLを用い，溶出試験法第2法により毎分50回転で試験を行う．溶出試験開始90分後，溶出液7 mL以上をとり，孔径0.45 μmのメンブランフィルターでろ過する．ろ液5 mLを正確に量り，0.1 mol/L塩酸試液を加えて正確に50 mLとし，試料溶液とする．

別に，塩酸エペリゾン標準品を五酸化リンを乾燥剤として24時間減圧乾燥し，その約0.05 gを精密に量り，水に溶かし，正確に100 mLとする．この液5 mLを正確に量り，水を加えて正確に50 mLとする．この液5 mLを正確に量り，0.1 mol/L塩酸試液を加えて正確に50 mLとし，標準溶液とする．

試料溶液及び標準溶液につき，0.1 mol/L塩酸試液を対照として吸光度測定法により試験を行い，262 nm付近の吸収極大の波長における吸光度 A_T 及び A_S を測定する．

本品の90分間の溶出率が70%以上のときは適合とする．

塩酸エペリゾン ($C_{17}H_{25}NO \cdot HCl$) の表示量に対する溶出率 (%)

$$= W_s \times A_T / A_S \times 9 / 5$$

W_s ：塩酸エペリゾン標準品の量 (mg)

塩酸エペリゾン標準品；日本薬局方外医薬品規格に規定する。

有効成分；塩酸エペリゾン

剤形；顆粒剤

含量；100 mg / g

溶出試験法；本品 0.5 g を正確に量り，試験液に水 900 mL を用い，溶出試験法第 2 法により毎分 50 回転で試験を行う．溶出試験開始 15 分後，溶出液 7 mL 以上をとり，孔径 0.45 μ m のメンブランフィルターでろ過する．ろ液 5 mL を正確に量り，0.1 mol/L 塩酸試液を加えて正確に 50 mL とし，試料溶液とする．

別に，塩酸エペリゾン標準品を五酸化リンを乾燥剤として 24 時間減圧乾燥し，その約 0.05 g を精密に量り，水に溶かし，正確に 100 mL とする．この液 5 mL を正確に量り，水を加えて正確に 50 mL とする．この液 5 mL を正確に量り，0.1 mol/L 塩酸試液を加えて正確に 50 mL とし，標準溶液とする．

試料溶液及び標準溶液につき，0.1 mol/L 塩酸試液を対照として吸光度測定法により試験を行い，262 nm 付近の吸収極大の波長における吸光度 A_T 及び A_S を測定する．

本品の 15 分間の溶出率が 85 % 以上のときは適合とする．

塩酸エペリゾン ($C_{17}H_{25}NO \cdot HCl$) の表示量に対する溶出率 (%)

$$= W_s \times A_T / A_S \times 9 / 5$$

W_s ：塩酸エペリゾン標準品の量 (mg)

塩酸エペリゾン標準品；日本薬局方外医薬品規格に規定する。