溶出曲線測定例
酒石酸メトプロロール錠２０ｍｇ

標準製剤ａ
１．有効成分名：酒石酸メトプロロール　２．剤形：錠剤　３．含量：20mg
４．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　５．回転数：50rpm
６．界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例
酒石酸メトプロロール錠２０ｍｇ

標準製剤ｂ
１．有効成分名：酒石酸メトプロロール　２．剤形：錠剤　３．含量：20mg
４．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　５．回転数：50rpm
６．界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例
酒石酸メトプロロール錠４０ｍｇ

標準製剤ａ
１．有効成分名：酒石酸メトプロロール　２．剤形：錠剤　３．含量：40mg
４．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　５．回転数：50rpm
６．界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例
酒石酸メトプロロール錠４０ｍｇ

標準製剤ｂ
１．有効成分名：酒石酸メトプロロール　２．剤形：錠剤　３．含量：40mg
４．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　５．回転数：50rpm
６．界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例
酒石酸メトプロロール徐放錠１２０ｍｇ

標準製剤 a
1．有効成分名：酒石酸メトプロロール　2．剤形：徐放錠　3．含量：120mg
4．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　5．回転数：50rpm
6．界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例
酒石酸メトプロロール徐放錠１２０ｍｇ

標準製剤ｂ
１．有効成分名：酒石酸メトプロロール　２．剤形：徐放錠　３．含量：120mg
４．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　５．回転数：50rpm
６．界面活性剤：使用せず